



LO QUE TODOS DEBEMOS SABER SOBRE LA VARRICELA



SECRETARÍA
DE SALUD
ALCALDÍA DE ARMENIA



VARI- CELA

Es una enfermedad causada por un virus altamente contagioso, que comienza con fiebre repentina moderada y síntomas generales muy leves. Actualmente se previene con vacuna.

SIGNOS Y SINTOMAS

Se caracteriza por la aparición en todo el cuerpo de lesiones tipo vejiga, con borde rojo, alargadas o redondeadas, que se rompen fácilmente, dejando una pequeña costra en el centro.

MODO DE TRANSMISION



Se transmite de persona a persona por contacto directo con pacientes con varicela y por dispersión aérea de secreciones respiratorias o contacto con el líquido de las ampollas.

El virus lo puede transmitir la mujer embarazada a su feto durante el primer y último trimestre de gestación.

DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD

- 1 El tiempo transcurrido entre el contagio de la enfermedad y la aparición de la misma puede ser hasta de 21 días.
- 2 Inicialmente presenta síntomas parecidos a la gripa.
- 3 Las primeras lesiones vienen acompañadas de picazón.
- 4 Las primeras manchas son de color rojo.
- 5 Estas lesiones se convierten en ampollas y pueden estar presentes en todo el cuerpo, incluyendo el cuero cabelludo y dentro de la boca.
- 6 Las vejigas empiezan a romperse y se secan.
- 7 Aparecen costras que después de 7 días ya no están.
- 8 Las lesiones infectadas son las que dejan cicatrices.



LISTA DE RECOMENDACIONES

1. Consulte a su médico.
2. El paciente debe permanecer aislado (la incapacidad debe ser de dos semanas).
3. Debe bañarse dos o tres veces al día (mañana y noche).
4. Tener las uñas cortas para evitar infecciones y cicatrices por rascado.
Si el niño se lastima por la noche colocarle guantes de hilo o algodón.
5. No aplicar ninguna crema sobre la ampolla ya que además de favorecer que se forme un emplaste, no permite ver si se produce una infección.
6. Intensificar medidas de desinfección en el hogar o institución educativa.

CONSULTAR AL MÉDICO URGENTE SI:

1. El contenido de las ampollas se torna sanguinolento.
2. Si presenta fiebre mayor a tres días, si notas que tu hijo está muy decaído con tendencia a quedarse dormido más de lo habitual y si tiene dolor abdominal.
3. Cuando las lesiones infectadas no curan.
4. Ante la presencia de dificultad respiratoria.

El hacinamiento y el pertenecer a la población de comunidades cerradas (como instituciones educativas o albergues), son algunos de los principales factores de riesgo para la propagación de la varicela, por eso es importante el aislamiento y notificación ante la presencia de casos.

Para mayor información, comuníquese con la Secretaría de Salud.

741 7100 ext. 230 ó 139



**SECRETARÍA
DE SALUD**
ALCALDÍA DE ARMENIA